

MỘT SỐ THUỐC CHỐNG CHỈ ĐỊNH DÙNG
CHO PHỤ NỮ CÓ THAI:

STT	Thuốc	Tác động bất lợi lên thai nhi	Thời gian nguy cơ		
I. Thuốc chống đông:					
1	- Acenocoumarol (Acenocoumarol 1mg)	Gây dị dạng thai nhi hoặc thai lưu	Trong toàn bộ thai kỳ		
2	Wafarin				
II. Thuốc giảm đau, chống viêm:					
3	Diclofenac (Diclofenac Kabi 75mg/3ml)	<ul style="list-style-type: none"> - Độc tính trên tim phổi - Rối loạn chức năng thận - Tăng thời gian chảy máu - Ức chế co bóp tử cung 	3 tháng cuối thai kỳ		
4	Ibuprofen				
5	Celecoxib (Mibecerex 200 mg)				
6	Piroxicam				
7	Meloxicam (Mobic 7.5mg, Melic 7.5mg)				
8	Ketorolac (Algesin-N 30mg/1ml)				
III. Thuốc hạ lipid máu:					
9	Atorvastatin (Atorvastatin 20 mg)			Gây hại cho thai nhi (do giảm tổng hợp cholesterol và dẫn xuất)	Trong thai kỳ
10	Simvastatin (Simvastatin 10 mg)				
11	Fluvastatin (Savi Fluvastatin 40mg)				
12	Rosuvastatin				
13	Pravastatin (Prevasel 10mg)				

